ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ / ΖΑΡΜΠΗ, 3 % CUT. SOL

Τοπικό αντισηπτικό (δέρμα & βλεννογόνοι), Αιμοστατικό

1. Χρήση σε τραυματισμούς: Έκπλυση της τραυματισμένης περιοχής με ικανή ποσότητα, όσο συχνά απαιτείται. Μετά το στέγνωμα, η τραυματισμένη περιοχή μπορεί να καλυφθεί με αποστειρωμένη γάζα.

Αντενδείξεις: Η χρήση σε υγιές δέρμα θα προκαλέσει τοπικό ερεθισμό και νέκρωση ιστού (λευκό χρώμα), τα οποία θα εξαφανιστούν εντός περίπου 1 ώρας.

2. Χρήση στη στοματική κοιλότητα (αφορά μόνο ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών με την επίβλεψη ενηλίκου): Αραίωση με διπλάσια ποσότητα νερού (2:1) και γαργαρισμοί για 2-3 λεπτά. Επανάληψη μέχρι 3 φορές ημερησίως.

Αντενδείξεις: Συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ πρήξιμο της γλώσσας.

Προειδοποιήσεις: Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια. Φυλάσσεται στη σφραγισμένη φιάλη, σε θερμοκρασία ≤ 25^{o}C, χωρίς φως, μακριά από παιδιά. Χρήση εξωτερική**.**

Σύνθεση: Υδατικό διάλυμα 3% Hydrogen Peroxide

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Δεν έχουν αναφερθεί.

Κύηση , θηλασμός και γονιμότητα: Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμοκοποιού σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών: Δεν υπάρχει επίδραση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες; Ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας ή αναφέρετε μέσω της κίτρινης κάρτας του ΕΟΦ, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός. Τηλ: 2132040380/337, www.eof.gr.

Ε.Ι.ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., Θηβών 35,19100 Μέγαρα, Τηλ. Επικ.: 2106430375

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ. ΕΟΦ: 87777/05-12-2013(52763/15/26-04-2016)

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις: 23/04/2018.